



Modalités d'un auto-prélèvement

Nom : Nom de naissance :
.....
Prénom : Date de naissance :
Adresse :

Résultats : A poster Au laboratoire Par internet

Avant le recueil notez vos noms, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par

Modalités du prélèvement :

- Effectué par le médecin/sage-femme
- Auto-prélèvement (si femme enceinte, PCR seule ou notifié sur la prescription)
- Date du prélèvement : Heure du prélèvement :
- Contrôle après traitement : oui lequel : non

Vérifier auprès du laboratoire les délais à respecter après traitement


Date de début des symptômes ou durée :

Signes cliniques :

- Irritation/rougeur/inflammation
- Pertes vaginales anormales malodorantes
- Lésions cutanéomuqueuses : vésicules ulcération
- Démangeaisons douleurs autres

Situation particulière :

- Mycoses récidivantes Bilan IST Exploration infertilité
- Examen systématique pendant la grossesse (recherche de Streptocoque B)



- 1- Sortir l'écouvillon ESWAB du sachet sans toucher la mousse ni la partie sous le trait rouge.
- 2- Tenir l'écouvillon d'une main en dirigeant la mousse vers soi (figure 2).
- 3- Avec l'autre main, écarter les grandes lèvres et insérer l'écouvillon dans le vagin (figure 3 et 4), en effectuant une légère rotation.
- 4- S'assurer que l'écouvillon touche bien les parois vaginales et effectuer une rotation pendant 10 à 15 secondes.
- 5- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 6- Dévisser le bouchon rose du tube et plonger l'écouvillon dans le liquide (qui est un conservateur).
- 7- Casser l'écouvillon au niveau du trait rouge, en le laissant dans le liquide et revisser le bouchon.

Rapporter l'écouvillon au laboratoire dans la pochette plastique.

L'écouvillon conservé à T° ambiante, doit être acheminé au laboratoire dans les 24 heures.