

MATERIEL

Il existe différents types d'écouvillon et milieu de transport en fonction du site à prélever et de la recherche à effectuer.

Les écouvillons de prélèvements, à embout floqué avec fibres de nylon, sont fournis, sur demande, par votre laboratoire ALLIANCE ANABIO.

ECOUVILLONS ESWAB avec milieu de transport AMIES



Bouchon ROSE = prélèvements vaginaux, cutanés, ORL

Bouchon ORANGE = prélèvements urétraux

Bouchon BLEU = prélèvements nasopharyngés pour recherche de coqueluche et coronavirus

INDICATIONS

- Bactériologie classique (bactéries aérobies, anaérobies, y compris gonocoque)
- Mycologie
- Recherche par PCR de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et Mycoplasma genitalium
- Recherche par PCR de Bordetella pertussis et Coronavirus 19

CONSERVATION

- 48h à température ambiante sauf pour Neisseria gonorrhoeae 24h

ECOUVILLONS avec milieu de transport UTM

Bouchon ROUGE = pour recherche d'herpes

Utiliser un écouvillon flexible pour la recherche de grippe, coronavirus 19 et VRS sur prélèvement nasopharyngé



INDICATIONS

- Recherche par PCR d'Herpès simplex virus 1 et 2
- Recherche par PCR des virus Influenzae A et B, Coronavirus 19 et VRS

CONSERVATION

- 48h, impérativement réfrigéré

REALISATION DU PRELEVEMENT

INDICATIONS

- Ecouillonner le site à prélever.
- Introduire l'écouvillon dans le tube, le casser en le pliant. Fermer le tube.
- Identifier le tube et remplir la fiche de transmission de prélèvement fournie avec les écouvillons, indiquer la date et l'heure de prélèvement ainsi que la localisation, les renseignements cliniques et traitements pris, en cours et/ou prévus. En l'absence de fiche de transmission, reporter l'ensemble de ces informations sur l'ordonnance.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Notes pour les prélèvements vaginaux :

- Prélever au niveau de l'endocol et des culs de sacs vaginaux avec le même écouvillon.
- Chez la femme enceinte, l'auto prélèvement est validé pour toutes les recherches.
- En dehors de la grossesse, l'auto prélèvement peut être proposé pour la recherche spécifique par PCR de *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Mycoplasma genitalium*.

Notes pour la recherche par PCR de *C trachomatis*, *N gonorrhoeae*, *M genitalium* et *T. Vaginalis*

- Chez la femme, privilégier la recherche sur prélèvement vaginal.
- Chez l'homme, privilégier la recherche sur 1er jet urinaire.
- Les urines ne sont pas mises en culture. La réalisation d'un antibiogramme, pour surveillance des résistances des gonocoques, n'est donc pas possible. Chez l'homme, en cas de suspicion de gonococcie (écoulement urétral important), effectuer, en plus, un écouvillonnage du méat urinaire ou pratiquer directement un prélèvement urétral.

Notes pour la recherche de coqueluche, coronavirus, grippe et VRS :

- Insérer l'écouvillon dans la narine le plus loin possible parallèlement au palais et le retirer délicatement en imprimant un léger mouvement rotatif. Recommencer ce geste dans l'autre narine avec le même écouvillon.
- Pour la coqueluche, la recherche ne doit être effectuée que si le patient tousse depuis moins de 3 semaines et s'il est vacciné depuis plus de 3 ans (ou si son statut vaccinal est inconnu).



Note pour la recherche d'herpès :

- Bien frotter le plancher des lésions ulcérées ou vésiculeuses