

IMPORTANT

En cas de spermogramme associé, ou dans un contexte de don de sperme ou d'assistance médicale à la procréation le patient doit être orienté au CECOS à l'hôpital Sud ou au laboratoire d'AMP de la clinique de la Sagesse. S'adresser directement à ces laboratoires.

Préconisations pour le recueil

- Prendre, au préalable, rendez-vous auprès du secrétariat.
- Avant le recueil noter nom, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par le laboratoire.
- Effectuer le recueil de préférence avant toute prise d'antibiotique. Sinon respecter un délai de 5 jours après l'arrêt des antibiotiques.
- Effectuer le prélèvement après une abstinence sexuelle de 2 jours.
- Se laver les mains
- Vider sa vessie
- Effectuer une désinfection soigneuse du gland, du méat, du sillon balanopréputial, du prépuce et des mains, suivie d'un rinçage soigneux au sérum physiologique.
- Sans attendre, recueillir le sperme dans le flacon stérile par masturbation.
- Bien refermer le flacon.
- Le rapporter au laboratoire, dans le sachet de transport (bleu ou rouge) à température ambiante le plus rapidement possible (idéalement dans les 2 heures).

Veillez remplir le questionnaire suivant

- Nom de naissance : 1^{er} Prénom :
- Date de naissance : ... / ... / ...
- Date du recueil : ... / ... / ... Heure du recueil : h
- Cet examen est-il réalisé dans le cadre :
 - D'un bilan d'infertilité ? NON OUI
 - De douleurs génitales ? NON OUI
- Avez-vous suivi un traitement antibiotique ? NON OUI
 - Si oui, lequel :
 - Date de la dernière prise : ... / ... / ...
- Est-ce un contrôle après traitement pour gonocoque, chlamydiae ou mycoplasme (attendre 4 semaines) ? NON OUI