

MATERIEL

Votre laboratoire vous fournit un flacon stérile avec un bouchon rouge.



Préconisations pour le recueil

- Avant le recueil notez vos noms, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par votre laboratoire.
- Effectuer le recueil de préférence avant toute prise d'antibiotique ou d'antifongique.
- Sinon attendre au moins : 5 jours après l'arrêt des antibiotiques ou 2 mois après l'arrêt des antifongiques oraux.

Suivre scrupuleusement le protocole pour éviter la présence de salive qui dilue et contamine le prélèvement.

- 1- Faire le prélèvement le matin au réveil après lavage de la bouche à l'eau et lors d'un effort de toux, aidé éventuellement d'un kinésithérapeute.
- 2- Recueillir le crachat dans le flacon stérile.
- 3- Remettre le flacon dans le sachet et bien le refermer.
- 4- L'apporter le plus rapidement possible au laboratoire (au maximum dans l'heure qui suit le recueil) en le maintenant à température ambiante.

Si recherche de mycobactéries (BK), il est recommandé de répéter le recueil 3 jours de suite.

Veillez remplir le questionnaire suivant

Nom :

Prénom :

Date de naissance : ... / ... / ...

Date du recueil : ... / ... / ...

Heure du recueil : h

Contexte clinique :

Avez-vous récemment pris un antibiotique/antifongique ?

OUI NON

Si oui, noter :

le nom de l'antibiotique/antifongique :

la date d'arrêt de l'antibiotique /antifongique :/...../.....

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi de bronchite chronique ?

OUI NON

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi d'une dilatation des bronches ?

OUI NON

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi d'une mucoviscidose ?

OUI NON

Etes-vous immunodéprimé ou avez-vous un traitement immunosuppresseur (Corticoïdes, chimio...) ?

OUI NON