

MATERIEL

Votre laboratoire vous fournit un flacon stérile avec un bouchon rouge.



Préconisations pour le recueil

- Avant le recueil notez vos noms, prénoms et date de naissance sur le flacon fourni par votre laboratoire.
- Effectuer le recueil de préférence avant toute prise d'antibiotique ou d'antifongique.
- Sinon attendre au moins 5 jours après l'arrêt des antibiotiques ou 3 mois après l'arrêt des antifongiques oraux.
- Suivre scrupuleusement le protocole pour éviter la présence de salive qui dilue et contamine le prélèvement.
- Faire le prélèvement **le matin au réveil** après lavage de la bouche à l'eau et lors d'un effort de toux, aidé éventuellement d'un kinésithérapeute.
- Recueillir le crachat dans le flacon stérile.
- Remettre le flacon dans le sachet et bien le refermer.
- Si recherche de mycobactéries (BK), il est recommandé de répéter le recueil 3 jours de suite.

Veillez remplir le questionnaire suivant / Ne pas le mettre au contact du flacon

Nom de naissance : Prénom :

Nom usuel : Date de naissance : ... / ... / ...

Date du recueil : ... / ... / ... Heure du recueil : h

Contexte clinique :

Avez-vous récemment pris un antibiotique/antifongique pour votre problème pulmonaire ?

OUI NON

Si oui, noter : le nom de l'antibiotique/antifongique :
la date d'arrêt de l'antibiotique /antifongique : .../.../.....

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi de bronchite chronique ?

OUI NON

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi d'une dilatation des bronches ?

OUI NON

Cet examen est-il réalisé dans le cadre d'un suivi d'une mucoviscidose ?

OUI NON

Etes-vous immunodéprimé ou avez-vous un traitement immunosuppresseur (Corticoïdes, chimio...) ?

OUI NON